





فصل اول: فیزیک و اندازه‌گیری (بخش سوم)

تحصیل باما



چگالی یک جسم نسبت به جرم آن به حجم آن است.

$$\rho = \frac{m}{V}$$

تحصیل باما

Physics

Mohammad Nokandeh

چگالی کمیتی عددی است و واحد آن در SI ، $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ است.

$$\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = \frac{\text{g}}{\text{lit}} \begin{matrix} \xrightarrow{\times 10^{-3}} \\ \xleftarrow{\times 10^3} \end{matrix} \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = \frac{\text{kg}}{\text{lit}}$$

تحصیل باما

پرسش ۱-۴

چگالی بنزین $0.8 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ است. توضیح دهید چرا آب مایع مناسبی برای خاموش کردن بنزین شعله‌ور نیست.



تحصیل باما

مثال ۱-۲

فلز اُسمیم ($\rho = 22/5 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$) یکی از چگال‌ترین مواد یافت شده روی زمین است. جرم قطعه‌ای از این ماده به حجم $23/0 \text{ cm}^3$ ، چند کیلوگرم است؟

پاسخ: از رابطه ۱-۱ داریم:

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow m = \rho V = (22/5 \times 10^3 \text{ kg/m}^3) \times (23/0 \times 10^{-6} \text{ m}^3) = 0/518 \text{ kg}$$

این نتیجه نشان می‌دهد که اگر قطعه‌ای مکعبی، به اندازه یک قوطی کبریت، از این فلز داشته باشیم، در این صورت جرم آن کمی بیشتر از نیم کیلوگرم خواهد بود.

تحصیل باما

تمرین ۵-۱

حجم خون در گردش یک فرد بالغ با توجه به جرمش، می تواند بین $4/7^{\circ}\text{L}$ تا $5/5^{\circ}\text{L}$ باشد. جرم $4/7^{\circ}\text{L}$ خون چند کیلوگرم است؟ چگالی خون را $1/05\text{g/cm}^3$ بگیرید.



تحصیل باما

تمرین ۱-۶

جرم و وزن تقریبی هوای درون کلاستان را پیدا کنید.



تحصیل باما

اگر چگالی جسمی کمتر از شاره باشد روی آن شناور می شود.

اگر چگالی آن برابر با شاره باشد در آن غوطه ور می شود.

اگر چگالی آن بیشتر از شاره باشد در ته ظرف ته نشین می شود.

DENSITY OF MATTERS



فعالیت ۱-۵




اگر پرتقالی را درون ظرف محتوی آب بیندازیم پیش‌بینی کنید چه اتفاقی می‌افتد؟ آزمایش را انجام دهید (شکل الف) و نتیجه مشاهده خود را با توجه به مفهوم چگالی توضیح دهید.

اگر پرتقال را بدون پوست درون ظرف محتوی آب بیندازیم دوباره پیش‌بینی کنید چه اتفاقی می‌افتد؟ آزمایش را مطابق شکل (ب) انجام دهید و نتیجه مشاهده خود را با توجه به مفهوم چگالی توضیح دهید. در آزمایش (الف) پرتقال جرم بیشتری دارد و اصطلاحاً سنگین‌تر است. آیا سنگین‌تر بودن یک جسم دلیلی بر فرو رفتن آن در آب است؟ توضیح دهید.


تحصیل باما

اگر چند مایع مخلوط‌نشده را در یک ظرف بریزیم به ترتیب از چگالی زیاد به کم از پایین به بالا قرار می‌گیرند.



تحصیل باما

پرسی ۱-۵



سه مایع مخلوط‌نشدنی A، B و C که چگالی‌های متفاوتی دارند درون استوانه‌ای شیشه‌ای ریخته شده‌اند. این سه مایع عبارت‌اند از: جیوه (با چگالی $13/6 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$)، روغن زیتون (با چگالی $9/20 \times 10^2 \text{ kg/m}^3$) و آب (با چگالی $1/00 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$) است. جنس هر یک از مایع‌های A، B و C درون استوانه را مشخص کنید.


تحصیل باما

اگر درون جسمی حفره باشد:

V ظاهری: حجم توپر + توخالی ← هندسه

V واقعی (مفید): حجم توپر ← $V = \frac{m}{\rho}$

V واقعی - V ظاهری = V حفره



تحصیل باما

اگر چند مایع را در ظرف بریزیم و با هم مخلوط شوند چگالی مخلوط حاصل از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید.

$$\rho_T = \frac{M_T}{V_T} = \frac{m_1 + m_2 + \dots}{V_1 + V_2 + \dots}$$

اگر حجم دو ماده با هم برابر باشد:

$$\rho_T = \frac{\rho_1 + \rho_2}{2}$$

اگر جرم دو ماده با هم برابر باشد:


$$\rho_T = \frac{2\rho_1\rho_2}{\rho_1 + \rho_2}$$

تحصیل باما

تای لاین (tie line):

برای محاسبه چگالی مخلوط دو ماده هنگامی که تغییر حجم نداریم به کار می‌رود و همان میانگین وزنی است.

روی یک پاره‌خط چگالی ماده‌های سازنده و محصول را مشخص می‌کنیم، فاصله چگالی مخلوط تا چگالی مواد سازنده به نسبت عکس حجم آن‌هاست.



اگر در اثر اختلاط حجم مخلوط n درصد کاهش یابد چگالی آن اینگونه حساب می شود:

$$\rho_T = \frac{m_1 + m_2}{(V_1 + V_2) \times \frac{100 - n}{100}}$$




تحصیل باما

درصد جسم خیس شده:

اگر چگالی جسمی ρ کمتر از چگالی آب ($1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$) باشد به اندازه $\rho \times 100$ درصد آن درون آب قرار می‌گیرد

(خیس) می‌شود.



تحصیل باما

ذوب شدن یخ: اگر چگالی آب $\rho_{\text{آب}} = 1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ و $\rho_{\text{یخ}} = 0.9 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ باشد داریم:



حجم $V : 10 \text{ cm}^3$

جرم $m : 9 \text{ g}$

-1 cm^3



9 cm^3

9 g

مسائل ذوب یخ یا انجماد آب مضرری از حالت بررسی شده است.



مثال: درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.



- چگالی در واقع جرم واحد حجم هر ماده است.
- چگالی یک لیوان آب دریا با چگالی کل آب دریا برابر است.
- با حل کردن نمک در آب چگالی آب تغییر نمی‌کند.
- اجسامی که در آب فرو می‌روند چگالی کمتری از آب دارند.
- به ازای جرم ثابت و یکسان، چگالی با حجم نسبت عکس دارد.
- چگالی با جرم رابطه مستقیم ندارد.
- چگالی آلیاژ از چگالی هر کدام از مواد مخلوط‌شده بیشتر است.



مثال: جسمی به جرم 315g را مطابق شکل در ظرف مدرجی قرار می‌دهیم. حجم آب پس از ورود جسم

به 160cm^3 می‌رسد. اگر چگالی جسم $10500 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ باشد، حجم اولیه آب درون ظرف مدرج چند cm^3 بوده

است؟



تحصیل باما


Physics

Mohammad Nokandeh



مثال: برای یافتن چگالی جسم آزمایش زیر با امکانات قابل مشاهده انجام شده است. با استفاده از

اطلاعات موجود چگالی جسم را بیابید. (جرم جسم 300g است.)



تحصیل باما

Physics

Mohammad Nokandeh

 **مثال:** یک استوانه به شعاع ۲cm و طول ۷cm داریم. اگر چگالی این استوانه $\frac{3}{1} \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ باشد، جرم این

استوانه چقدر است؟ ($\pi \simeq 3$)



تحصیل باما

 **مثال:** اگر صد گرم آب یخ بزند چگالی آب ($1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$) به چگالی یخ ($0.9 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$) تبدیل می‌شود. در این

فرایند جرم یخ از آب قبل از یخ زدن بیشتر، مساوی یا کمتر است؟



تحصیل باما


 **مثال:** مکعبی آلومینیومی داریم که $۲۱/۶\text{g}$ جرم دارد. ($\rho_{\text{آلومینیوم}} = ۲/۷ \times ۱۰^۳ \frac{\text{kg}}{\text{m}^۳}, \pi = ۳$)

مکعب بالا را ذوب کرده و از آن یک حجم کروی می‌سازیم. شعاع این کره را به دست آورید.



 **مثال:** کره‌ای به شعاع ۱۰ سانتی‌متر از ماده‌ای به چگالی $4000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ ساخته شده است. جرم این کره ۱۰

کیلوگرم است. حجم حفره درون کره چند سانتی‌متر مکعب است؟ ($\pi = 3$)



تحصیل باما



مثال: ۳۰ درصد از حجم ظاهری یک جسم فلزی که دارای حفره است را فلز تشکیل داده است. اگر حجم


حفره 84cm^3 و جرم جسم 270 گرم باشد، چگالی فلز چند $\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ است؟



تأسیسات آموزشی

 **مثال:** 50cm^3 الکل را با 150cm^3 آب مخلوط می‌کنیم. چگالی محلول را محاسبه کنید. (با فرض اینکه

حجم محلول از مجموع حجم آب و الکل به دست آید) $(\rho_{\text{الکل}} = 0.8 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \text{ و } \rho_{\text{آب}} = 1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3})$



تحصیل باما

 **مثال:** ۹۰ گرم مس را با چند گرم روی مخلوط کنیم تا آلیاژی به چگالی $۷ \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ داشته باشیم؟

(چگالی مس $۹ \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ و چگالی روی $۷ \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$)



تحصیل باما

 **مثال:** سه مایع با چگالی‌های $2 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ و $4 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ و $10 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ را با جرم‌های مساوی با یکدیگر ترکیب

می‌کنیم، چگالی ترکیب حاصل چند گرم بر سانتی‌متر مکعب می‌شود؟



تحصیل باما

تست ۱: یک قطعه فلز را که چگالی آن $\frac{2}{7} \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ است کاملاً در ظرفی پر از الکل به چگالی $\frac{8}{10} \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ 

وارد می‌کنیم و به اندازه 160° گرم الکل از ظرف بیرون می‌ریزد. جرم قطعه فلز چند گرم است؟

۵۴۰ (۱)

۴۵۰ (۲)

۴۳۲ (۳)

۲۰۰ (۴)

تحصیل باما



تست ۲: می‌خواهیم از فلزی به چگالی $6 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ ، کره توپری به شعاع ۵cm بسازیم. جرم این کره چند

کیلوگرم می‌شود؟ ($\pi = 3/14$)

۱/۵۷ (۱)

۲/۳۶ (۲)

۳/۱۴ (۳)


۴/۷۱ (۴)

تحصیل باما




تست ۳: در یک آزمایش، جرم و حجم یک جسم جامد را مطابق شکل زیر، پیدا می‌کنیم. با توجه به

داده‌های روی شکل چگالی جسم در SI، چقدر است؟



ترازوی رقمی



(۱) ۲۵۰۰

(۲) ۲۰۵۰

(۳) ۲/۵

(۴) ۲/۰۵

تحصیل باما

Physics

Mohammad Nokandeh



تست ۴: اگر یک ظرف توخالی به جرم ۲۰۰ گرم را پر از مایعی به چگالی $\rho_1 = 1/6 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ کنیم، جرم

مجموعه ۶۰۰ گرم می‌شود. حال اگر این ظرف را پر از مایعی به چگالی ρ_2 نماییم، جرم مجموعه ۳۰۰ گرم

می‌شود. ρ_2 چند گرم بر سانتی‌متر مکعب است؟

۱/۵ (۴)

۰/۹ (۳)

۰/۸ (۲)

۰/۴ (۱)

تحصیل باما



تست ۵: با ذوب M گرم از عنصری یک کره توپر به شعاع R ساخته‌ایم. اگر بخواهیم از همین ماده

استوانه‌ای به شعاع $2R$ و ارتفاع $\frac{R}{4}$ بسازیم، جرم مورد نیاز چند M است؟

(۱) 0.5

(۲) 0.75

(۳) 1

(۴) 1.5

تحصیل باما


Physics

Mohammad Nokandeh



تست ۶: مطابق شکل زیر استوانه‌ای توخالی به ارتفاع ۲۰ سانتی‌متر در اختیار داریم. اگر چگالی ماده

تشکیل‌دهنده آن $\frac{5}{6} \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ باشد، جرم استوانه چند کیلوگرم است؟ ($\pi = 3$)



(۱) ۲۴ / ۹۶

(۲) ۲۸ / ۳۲

(۳) ۳۵ / ۶

(۴) ۴۲ / ۶

تحصیل باما

Physics

Mohammad Nokandeh



تست ۷: دو استوانه همگن A و B دارای جرم و ارتفاع مساوی‌اند. استوانه A توپر و استوانه B توخالی است. اگر شعاع خارجی این دو استوانه با هم برابر و شعاع داخلی استوانه B نصف شعاع خارجی آن باشد، چگالی استوانه A چند برابر چگالی استوانه B است؟

$$(1) \frac{1}{4}$$

$$(2) \frac{1}{2}$$

$$(3) \frac{2}{3}$$

$$(4) \frac{3}{4}$$

تحصیل باما



تست ۸: در مخلوطی از آب و یخ، مقداری یخ ذوب می‌شود و حجم مخلوط 5cm^3 کاهش می‌یابد.

جرم یخ ذوب شده چند گرم است؟ $\rho_{\text{یخ}} = 0.9 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ و $\rho_{\text{آب}} = 1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$

(۱) ۴/۵

(۲) ۵

(۳) ۴۵

(۴) ۵۰

تحصیل باما



تست ۹: ارتفاع یک مخروط توپُر به چگالی ρ_1 برابر طول ضلع یک مکعب توپُر به چگالی ρ_2 است و

شعاع قاعده آن، نصف طول ضلع مکعب است. اگر جرم این دو با هم برابر باشد، $\frac{\rho_1}{\rho_2}$ کدام است؟ ($\pi = 3$)

$$2 \text{ (4)}$$

$$4 \text{ (3)}$$

$$\frac{1}{4} \text{ (2)}$$

$$\frac{3}{4} \text{ (1)}$$

تحصیل باما



تست ۱۰: جرم دو کره‌ی همگن توپُر A و B با هم برابر است. اگر شعاع کره‌ی A برابر 3 cm و شعاع

کره‌ی B برابر ۶ سانتی‌متر باشد، چگالی کره‌ی A چند برابر چگالی کره‌ی B است؟

۴ ($2\sqrt{2}$)

۸ (۳)

۴ (۲)

۲ (۱)

تحصیل باما

Physics

Mohammad Nokandeh



تست ۱۱: اگر در اثر افزایش دما، حجم جسمی ۲۵ درصد افزایش یابد، چگالی جسم چگونه تغییر می‌کند؟

(۱) ۲۵ درصد کاهش می‌یابد.


(۳) ۲۰ درصد کاهش می‌یابد.

(۲) ۷۵ درصد کاهش می‌یابد.

(۴) ۸۰ درصد کاهش می‌یابد.

تحصیل باما

تست ۱۲: با توجه به نمودار زیر چگالی جسم A چند برابر چگالی جسم B است؟ 



(۱) $\frac{1}{2}$

(۲) $\frac{8}{9}$

(۳) $\frac{9}{8}$

(۴) ۲

تحصیل باما

تست ۱۳: شعاع یک کره فلزی ۵ سانتی متر و جرم آن ۱۰۸۰ گرم و چگالی آن $\frac{3}{7} \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ است. درون

این کره یک حفره وجود دارد. حجم این حفره چند درصد حجم کره را تشکیل می دهد؟ ($\pi \simeq 3$)

۲۵ (۴)

۲۰ (۳)

۱۵ (۲)

۱۰ (۱)

تحصیل باما

تست ۱۴: طول هر ضلع مکعب فلزی ۱۰cm و جرم آن ۶kg است. اگر چگالی فلز $۸ \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ باشد، مکعب:

(۱) توپر است و حجم آن ۱۰۷۵۰cm^3 است.

(۲) توپر است و حجم آن ۱۰۰۰cm^3 است.

(۳) حفره خالی دارد و حجم حفره ۷۵۰cm^3 است.

(۴) حفره خالی دارد و حجم حفره ۲۵۰cm^3 است.

تحصیل باما



تست ۱۵: یک جسم فلزی به جرم 3kg را درون ظرف پر از نفتی به چگالی $6 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ می‌اندازیم و به

اندازه 540 گرم نفت از ظرف بیرون می‌ریزد. اگر درون جسم حفره‌ای وجود داشته باشد، حجم حفره چند

سانتی‌متر مکعب است؟ ($\rho_{\text{فلز}} = 6 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$)

(۱) 200

(۲) 400

(۳) 550

(۴) 700

تحصیل باما



تست ۱۶: یک مکعب به ابعاد ۵cm از فلزی به چگالی $۸ \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ ساخته شده است. درون آن حفره‌ای

وجود دارد. اگر حفره را با مایعی به چگالی $۲ \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ پر کنیم، جرم کل مکعب ۹۸۵g می‌شود، حجم حفره چند

سانتی‌متر مکعب است؟

(۱) ۲ / ۵

(۲) ۵

(۳) ۱۰

(۴) ۱۵

تحصیل باما



تست ۱۷: دو پلیمر به حجم‌های V_1 و V_2 که $V_2 = 2V_1$ است، با چگالی‌های $\rho_1 = 40$ و $\rho_2 = 70$ گرم بر

سانتی‌متر مکعب را با هم مخلوط می‌کنیم. چگالی مخلوط چند گرم بر سانتی‌متر مکعب خواهد بود؟

(۱) ۵۵

(۲) ۵۰

(۳) ۶۰

(۴) $\frac{110}{3}$

تحصیل باما



تست ۱۸: دو پلیمر با چگالی‌های 0.4 و 0.5 گرم بر سانتی‌متر مکعب با حجم‌های یکسان با یکدیگر

ترکیب می‌شوند تا ماده جدید ایجاد شود. چگالی ماده جدید چند $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ است؟

(۱) 0.9

(۲) 0.45

(۳) 450

(۴) 0.1

تحصیل باما



تست ۱۹: دو ماده که با یکدیگر واکنش نمی‌دهند به جرم‌های یکسان و با چگالی $\rho_1 = 200$ و $\rho_2 = 300$

کیلوگرم بر متر مکعب با یکدیگر ترکیب کرده و آلیاژ جدید می‌سازیم. چگالی آلیاژ جدید چند $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ است؟

(۱) ۲۵۰

(۲) ۵۰۰

(۳) ۲۶۰

(۴) ۲۴۰

تحصیل باما



تست ۲۰: برای تهیه آلیاژی ۲۵ درصد از جرم آن را از ماده‌ای به چگالی ρ و بقیه را از ماده‌ای به چگالی

4ρ ساخته‌ایم. چگالی آلیاژ چند برابر ρ است؟

(۱) $\frac{5}{3}$

(۲) $\frac{16}{7}$

(۳) $\frac{11}{3}$

(۴) $\frac{13}{4}$



تحصیل باما



تست ۲۱: مخلوطی از دو مایع به چگالی‌های $\rho_1 = 1/2 \frac{\text{kg}}{\text{L}}$ و $\rho_2 = 0/8 \frac{\text{kg}}{\text{L}}$ درست شده است. اگر

چگالی مخلوط $900 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ باشد نسبت جرم مایع (۱) به جرم مایع (۲) کدام است؟ (در اثر مخلوط کردن دو

مایع، تغییر حجم رخ نمی‌دهد.)

$$(1) \frac{9}{2}$$

$$(2) \frac{2}{9}$$

$$(3) 2$$


$$(4) \frac{1}{2}$$

تحصیل باما



تست ۲۲: نمودار زیر مربوط به دو مایع A و B است. اگر جرم مساوی از این دو مایع را با هم مخلوط

کنیم، چگالی چند گرم بر سانتی متر مکعب می شود؟



(۱) $1/5$

(۲) $1/6$

(۳) $1/8$

(۴) 2

تحصیل باما

Physics

Mohammad Nokandeh



تست ۲۳: جواهر فروشی در ساختن یک قطعه جواهر به جای طلا خالص، مقداری نقره نیز به کار برده

است، اگر حجم قطعه ساخته شده ۵ سانتی متر مکعب و چگالی آن $\frac{13}{6} \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ باشد، جرم نقره به کار رفته،

چند گرم است؟ (چگالی نقره و طلا به ترتیب $\frac{10}{3} \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ و $\frac{19}{3} \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ فرض شود.)

۸ (۱)

۳۰ (۲)

۳۴ (۳)

۳۸ (۴)

تحصیل باما



تست ۲۴: ۶۰۰ گرم از ماده A را با ۴۰ سانتی متر مکعب از ماده B مخلوط می کنیم. اگر چگالی این آلیاژ

$15 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ باشد، طی عمل مخلوط کردن، چند سانتی متر مکعب کاهش حجم اتفاق افتاده است؟

$$(\rho_B = 7 / 5 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}, \rho_A = 20 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3})$$

۱۰ (۴)

۷ / ۵ (۳)

۵ (۲)

۱ (صفر)

تحصیل باما